

醫令代碼	IAKI
藥品名稱	AKINETON
成分含量	(Bipiden) 5MG/ML
藥品分類	抗巴金森藥物
藥品外觀	
副作用	疲倦、眩暈和嗜睡
用藥指示	
藥品外觀	1ML/安瓶無色液體
用途	注射劑
適應症狀	帕金森氏症
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IALBA
藥品名稱	ALBUMIN
成分含量	20% 50ML 貝靈血清蛋白注射液
藥品分類	血清類
藥品外觀	
副作用	蕁麻疹、呼吸困難、低血壓
用藥指示	
藥品外觀	
用途	
適應症狀	低蛋白血症、休克、燒傷
用法用量	QD 每日一次 早上 飯後使用
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IAMIA
藥品名稱	AMINFEC
成分含量	250MG/2ML(Amikacin) 安炎注射液
藥品分類	抗生素-胺基配醣體
藥品外觀	
副作用	腎毒性、耳毒性
用藥指示	
藥品外觀	2ML/玻璃瓶無色液體
用途	
適應症狀	革蘭氏陰性菌所引起感染症
用法用量	Q12H 每 12 小時使用一次
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IAMII
藥品名稱	Aminophylline
成分含量	250mg 心安寧注射液
藥品分類	呼吸道平滑肌鬆弛劑
藥品外觀	
副作用	心悸亢進, 顏面潮紅
用藥指示	
藥品外觀	10ml/amp 透明液體
用途	
適應症狀	支氣管氣喘急支氣管痙攣
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IAMIN																																				
藥品名稱	AMINOPOLY-H【&】																																				
成分含量	500ml 富安命注射液																																				
藥品分類	卡路里複方製劑																																				
藥品外觀	 <p>富安命注射液 AMINOPOLY-H INJECTION</p> <p>成分：Each Vial (500ml) Contains:</p> <table border="1"> <tr> <td>L-Asparagine</td> <td>4.0gm</td> <td>L-Arginine</td> <td>4.0gm</td> </tr> <tr> <td>L-Aspartic</td> <td>4.0gm</td> <td>L-Aspartic Acid</td> <td>0.5gm</td> </tr> <tr> <td>L-Alanine Acetate</td> <td>1.97gm</td> <td>L-Histidine</td> <td>1.50gm</td> </tr> <tr> <td>L-Methionine</td> <td>0.32gm</td> <td>L-Proline</td> <td>2.00gm</td> </tr> <tr> <td>L-Phenylalanine</td> <td>0.15gm</td> <td>L-Serine</td> <td>1.0gm</td> </tr> <tr> <td>L-Threonine</td> <td>1.5gm</td> <td>L-Tyrosine</td> <td>0.5gm</td> </tr> <tr> <td>L-Tryptophan</td> <td>0.35gm</td> <td>Amino Acids Acid</td> <td>2.0gm</td> </tr> <tr> <td>L-Isoleucine</td> <td>4.45gm</td> <td>L-Cysteine</td> <td>0.5gm</td> </tr> <tr> <td>L-Alanine</td> <td>4.0gm</td> <td>pH 6.8-7.8 等滲注射液 25</td> <td></td> </tr> </table> <p>每瓶裝有 500ml 注射液</p>	L-Asparagine	4.0gm	L-Arginine	4.0gm	L-Aspartic	4.0gm	L-Aspartic Acid	0.5gm	L-Alanine Acetate	1.97gm	L-Histidine	1.50gm	L-Methionine	0.32gm	L-Proline	2.00gm	L-Phenylalanine	0.15gm	L-Serine	1.0gm	L-Threonine	1.5gm	L-Tyrosine	0.5gm	L-Tryptophan	0.35gm	Amino Acids Acid	2.0gm	L-Isoleucine	4.45gm	L-Cysteine	0.5gm	L-Alanine	4.0gm	pH 6.8-7.8 等滲注射液 25	
L-Asparagine	4.0gm	L-Arginine	4.0gm																																		
L-Aspartic	4.0gm	L-Aspartic Acid	0.5gm																																		
L-Alanine Acetate	1.97gm	L-Histidine	1.50gm																																		
L-Methionine	0.32gm	L-Proline	2.00gm																																		
L-Phenylalanine	0.15gm	L-Serine	1.0gm																																		
L-Threonine	1.5gm	L-Tyrosine	0.5gm																																		
L-Tryptophan	0.35gm	Amino Acids Acid	2.0gm																																		
L-Isoleucine	4.45gm	L-Cysteine	0.5gm																																		
L-Alanine	4.0gm	pH 6.8-7.8 等滲注射液 25																																			
副作用	水腫,稀釋性血鈣過少症																																				
用藥指示																																					
藥品外觀																																					
用途																																					
適應症狀	治療肝硬化或肝炎引發之肝昏迷																																				
用法用量																																					
懷孕哺乳																																					
禁忌																																					
注意事項																																					

醫令代碼	IAMIO
藥品名稱	AMIODARONE
成分含量	(CORDARONE)150MG 臚得樂
藥品分類	心臟用藥
藥品外觀	
副作用	高警訊藥品。注射部位可能有發炎反應
用藥指示	
藥品外觀	3ML/玻璃安瓶無色液體
用途	
適應症狀	治療心室纖維顫動,心博過速
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IAMP
藥品名稱	AMPOLIN
成分含量	安博儻素注射劑 500MG
藥品分類	
藥品外觀	
副作用	
用藥指示	
藥品外觀	
用途	
適應症狀	
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IANEI
藥品名稱	ANEXATE
成分含量	(Flumazenil) 0.5MG/5ML 安易醒
藥品分類	未分類治療藥物
藥品外觀	
副作用	顏面潮紅,噁心,嘔吐,暈眩
用藥指示	
藥品外觀	5ml / amp 透明液體
用途	
適應症狀	benzodiazepine 類藥物中毒解毒劑
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IART
藥品名稱	Hikamilon Dispo 1%
成分含量	2.5ml
藥品分類	
藥品外觀	
副作用	局部疼痛,關節水腫
用藥指示	
藥品外觀	2.5ml/注射筒,無色透明黏稠液
用途	
適應症狀	關節機能改善劑
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IATRI
藥品名稱	Atropin
成分含量	1mg 硫酸阿托品
藥品分類	Antimuscarinics/antispasmodics
藥品外觀	
副作用	口乾,視力模糊,心悸,潮紅
用藥指示	
藥品外觀	1ml / amp 無色透明液體
用途	
適應症狀	散瞳,睫狀肌麻痺,各種心律不整
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IB12I
藥品名稱	VIT B
成分含量	12 ML/1000MCG HYDROXOCOBALAMMIN
藥品分類	維生素 B 群
藥品外觀	
副作用	發疹或局部腫脹
用藥指示	
藥品外觀	1ml/amp 紅色液體
用途	
適應症狀	惡性貧血
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IBA
藥品名稱	BayHep-B (B 型肝炎免疫人血球蛋白)
成分含量	1ML
藥品分類	血清類
藥品外觀	
副作用	注射處局部疼痛及觸痛,皮膚疹
用藥指示	
藥品外觀	1mi/瓶裝 無色透明液
用途	
適應症狀	預防 B 型肝炎之感染
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IBC
藥品名稱	Combeplex
成分含量	1ML
藥品分類	維生素 B 群
藥品外觀	
副作用	注射處局部疼痛
用藥指示	
藥品外觀	
用途	
適應症狀	維他命 B 群補充
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IBOS
藥品名稱	BOSMIN
成分含量	(Epinephrine)1mg【&】腎上腺素注射液
藥品分類	擬交感神經興奮藥物
藥品外觀	
副作用	胸痛,博異常,噁心,嘔吐,頭暈,頭痛,呼吸困難
用藥指示	
藥品外觀	1ML/amp 無色透明液
用途	
適應症狀	休克,呼吸道痙攣,心跳停止之急救,喉頭水腫
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IBUS
藥品名稱	Fucon injection
成分含量	20MG 保賜康注射液
藥品分類	Antimuscarinics/antispasmodics
藥品外觀	
副作用	注射處局部疼痛腫脹
用藥指示	
藥品外觀	1ML/amp 無色透明液
用途	
適應症狀	胃,十二指腸潰瘍,膽管,尿路痙攣
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	ICALI
藥品名稱	Vitacal
成分含量	(Glucose)20ml 美達加祿針
藥品分類	卡路里複方製劑
藥品外觀	
副作用	高警訊藥品。血栓性靜脈炎
用藥指示	
藥品外觀	20ML/安瓶無色液體
用途	
適應症狀	低血鈣症狀之治療與改善
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	ICEF
藥品名稱	Cefepime
成分含量	1G 斯沛服乾粉注射劑
藥品分類	抗生素-頭孢子菌類
藥品外觀	
副作用	
用藥指示	
藥品外觀	
用途	
適應症狀	
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	ICEFF
藥品名稱	Satzolin
成分含量	(cefazolin)1GM
藥品分類	抗生素-頭孢子菌類
藥品外觀	
副作用	暈眩,耳鳴,發疹,搔癢
用藥指示	
藥品外觀	白色粉末瓶裝
用途	
適應症狀	細菌引起之感染症
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	ICEFU
藥品名稱	CEFUROXIME
成分含量	750MG 賜福樂信
藥品分類	抗生素-頭孢子菌類
藥品外觀	
副作用	腸胃不適,皮膚潮紅
用藥指示	
藥品外觀	白色粉末瓶裝
用途	
適應症狀	細菌引起之感染
用法用量	Q6H 每 6 小時使用一次
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	ICLEI
藥品名稱	B. B. INJ
成分含量	(CLINDAMYCIN) 300MG/2ML 比比黴素注射液
藥品分類	其他抗生素類
藥品外觀	
副作用	
用藥指示	
藥品外觀	
用途	
適應症狀	
用法用量	Q6H 每 6 小時使用一次
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	ICOL
藥品名稱	COLIMYCIN
成分含量	200 萬單位克痢黴素
藥品分類	抗生素-抗黴菌劑
藥品外觀	
副作用	
用藥指示	
藥品外觀	
用途	
適應症狀	綠膿菌、大腸菌、肺炎桿菌、大腸桿菌、赤痢菌感染症。
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	ICVVHB
藥品名稱	Sodium Chloride
成分含量	0.45% 2760ML
藥品分類	血液製劑複方
藥品外觀	
副作用	
用藥指示	
藥品外觀	
用途	
適應症狀	
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IDBI
藥品名稱	Gendobu
成分含量	(Dobutamine)20ML 12.5MG/ML 健多博注射液
藥品分類	擬交感神經興奮藥物
藥品外觀	
副作用	高警訊藥品。增加心跳,靜脈炎,偶有頭痛心悸,呼吸短促
用藥指示	
藥品外觀	20ml/瓶裝 無色透明液
用途	
適應症狀	增加心肌收縮力
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IDECI
藥品名稱	Dexamethasone
成分含量	4mg 力克樂注射液
藥品分類	腎上腺素
藥品外觀	
副作用	鈉儲留、體液儲留、充血性心臟衰竭、鉀流失、低血鉀性酸中毒、高血壓、肌肉無力、骨質疏鬆、消化性潰瘍、穿孔及出血、胰臟炎、傷口癒合緩慢、臉部紅斑、頭痛、眩暈、月經不規則、類庫欣氏症、後囊性白內障、青光眼、
用藥指示	可稀釋於 Dextrose 5 % in water、Sodium chloride 0.9 % 。
藥品外觀	利解痛注射液(Dexamethasone phosphate) 4mg/ml 字樣
用途	
適應症狀	支氣管氣喘、風濕性關節炎、重症皮膚疾患、火傷、咽喉炎、蕁麻疹。支氣管氣喘、風濕性關節炎、重症皮膚疾患、火傷、咽喉炎、蕁麻疹咽喉炎、蕁麻疹
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IDEMI
藥品名稱	管 2-DEMERAL 【&】 (pethidinae)
成分含量	50MG 鹽酸配西汀
藥品分類	阿片類似藥
藥品外觀	
副作用	高警訊藥品。呼吸抑制
用藥指示	
藥品外觀	1ml/amp 無色透明液
用途	
適應症狀	陣痛
用法用量	PRN
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	ICIFI
藥品名稱	DIFLUCAN IV
成分含量	100MG
藥品分類	抗生素-抗黴菌劑
藥品外觀	
副作用	噁心,腹痛,腹瀉,皮膚疹
用藥指示	
藥品外觀	50ml/瓶裝 無色透明液
用途	
適應症狀	抗黴菌劑
用法用量	Q6H 每 6 小時使用一次
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	ICIGI
藥品名稱	DIGOXIN
成分含量	0.5MG/2ML【&】隆我心
藥品分類	心臟用藥
藥品外觀	
副作用	高警訊藥品。不規則脈搏,食慾減退,噁心,嘔吐,精神混亂,欲睡
用藥指示	
藥品外觀	2ml /amp 無色透明液
用途	
適應症狀	心臟衰竭,心房撲動
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	


醫令代碼	IDIL
藥品名稱	Aleviatin(phenytion)
成分含量	250mg/5ml 阿雷彼阿慶注射液
藥品分類	妥因類
藥品外觀	
副作用	Stevens-Johnson 症候群
用藥指示	
藥品外觀	5ml/amp 無色透明液
用途	
適應症狀	癲癇症
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IDOI
藥品名稱	MIDAZO
成分含量	5MG/ML 米達諾注射劑
藥品分類	苯二氮平衍生物
藥品外觀	
副作用	高警訊藥品。嗜睡,過度鎮定,警覺性降低,頭痛,暈眩
用藥指示	
藥品外觀	1ml/amp 無色透明液
用途	
適應症狀	知覺鎮靜,手術前給藥,麻醉誘導及維持
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IDOP
藥品名稱	Dopamin 【&】
成分含量	200mg/5ml/amp
藥品分類	擬交感神經興奮藥物
藥品外觀	
副作用	高警訊藥品。噁心,嘔吐,心跳加快,心絞痛,呼吸困難
用藥指示	
藥品外觀	5ml/amp 無色透明液
用途	
適應症狀	休克症候群及心臟衰竭
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IDOPI
藥品名稱	EASYDOPA 【&】 易多巴注射液
成分含量	
藥品分類	
藥品外觀	
副作用	
用藥指示	
藥品外觀	
用途	
適應症狀	休克症候群及心臟衰竭
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IDRAI
藥品名稱	DRAMAMINE(dimemhydrinate)
成分含量	50MG 待免暈
藥品分類	抗組織胺劑
藥品外觀	
副作用	昏睡
用藥指示	
藥品外觀	1ml/amp 無色透明液
用途	
適應症狀	治療及預防動暈及美尼爾氏症引起之暈眩
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IEPHI
藥品名稱	EPHEDRINE
成分含量	40MG/ML 鹽酸麻黃素
藥品分類	擬交感神經興奮藥物
藥品外觀	
副作用	高警訊藥品。胸痛,心跳不規則,噁心,嘔吐,呼吸困難,神經緊張
用藥指示	
藥品外觀	1ml/amp 無色透明液
用途	
適應症狀	支氣管性氣喘,脊椎麻痺導致急性低血壓
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IEPO
藥品名稱	EPO 2000 IU(epoepin beta)容可曼
成分含量	
藥品分類	血液製劑
藥品外觀	 <p>The image shows the packaging for Recormon (Epoetin beta) 2000 IU / 0.3 ml. The box is white with a red stripe and contains the text: 'Recormon® 容可曼®', 'Epoetin beta', '針筒裝注射劑2000國際單位', '2000 IU / 0.3 ml', '6 pre-filled syringes of 0.3 ml solution for injection', '6 needles 27 G1/2', and the Roche logo. Below the box, several pre-filled syringes are visible in their packaging.</p>
副作用	偶有血壓上升,頭痛
用藥指示	
藥品外觀	0.3ml/針筒裝 無色透明液
用途	
適應症狀	治療慢性腎衰竭且伴隨症狀性貧血
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IFE
藥品名稱	FERRUM 優鐵注射劑
成分含量	
藥品分類	
藥品外觀	
副作用	
用藥指示	
藥品外觀	
用途	
適應症狀	
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	


醫令代碼	IFEN
藥品名稱	管 2-FENTANYL
成分含量	0.05MG/2ML 【&】 吩坦尼
藥品分類	阿片類似藥
藥品外觀	
副作用	呼吸抑制,心跳過慢,低血壓,噁心,嘔吐,暈眩
用藥指示	
藥品外觀	1ml/amp 無色透明液
用途	
適應症狀	麻醉和麻醉前給藥,急性疼痛緊急治療
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IFEU
藥品名稱	Desman injection 得賜滿注射液
成分含量	
藥品分類	鐵製劑
藥品外觀	
副作用	
用藥指示	
藥品外觀	
用途	
適應症狀	
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IFIL
藥品名稱	Filgrastim INJ 75U
成分含量	惠爾血添 75ug
藥品分類	血液製劑
藥品外觀	
副作用	
用藥指示	
藥品外觀	
用途	
適應症狀	
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IFOR2
藥品名稱	TATUMCEF POWDER
成分含量	2GM 祐坦賜福乾粉注射劑
藥品分類	
藥品外觀	
副作用	腹瀉,噁心,過敏,血栓性靜脈炎
用藥指示	
藥品外觀	對頭孢子菌抗生素過敏者不可使用
用途	
適應症狀	對多種乙內醯胺西每有抵抗力、並對廣範圍的革蘭氏陽性及陰性細菌有效。
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IFRA
藥品名稱	FRAGMIN【&】
成分含量	4ML.2500IU/ML
藥品分類	抗凝血劑
藥品外觀	
副作用	
用藥指示	
藥品外觀	
用途	
適應症狀	血栓性栓塞及其預防，抗凝血
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IGLY
藥品名稱	Glycetose 葛林縮斯注射劑
成分含量	500ML
藥品分類	利尿劑複方
藥品外觀	
副作用	血栓性靜脈炎
用藥指示	
藥品外觀	500ML/玻璃瓶無色液體
用途	
適應症狀	降低顱內壓、腦水腫
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IGM1
藥品名稱	GENTAMYCIN
成分含量	80MG/2ML 健達黴素
藥品分類	抗生素-胺基配醣體
藥品外觀	
副作用	偶有休克,呼吸困難,胸悶,噁心,嘔吐
用藥指示	
藥品外觀	2ml/amp 無色透明液
用途	
適應症狀	革蘭氏陽性及陰性菌引起之感染症
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IH1N1
藥品名稱	H1N1 疫苗
成分含量	5ML/VIAL 諾華
藥品分類	VAXIGRIP
藥品外觀	
副作用	
用藥指示	
藥品外觀	
用途	
適應症狀	
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IH1N2
藥品名稱	H1N1 疫苗
成分含量	20ML/VIAL 國光
藥品分類	VAXIGRIP
藥品外觀	
副作用	
用藥指示	
藥品外觀	
用途	
適應症狀	
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IHAL1
藥品名稱	U-DOLAN DECANOATE(Haloperidol)
成分含量	50MG/ML 優得安注射液
藥品分類	抗精神病藥
藥品外觀	
副作用	昏睡
用藥指示	
藥品外觀	1ml/amp 無色透明液
用途	
適應症狀	精神分裂症,狂躁症
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	


醫令代碼	IHAV
藥品名稱	A 肝疫苗(HAVRIX-A)
成分含量	
藥品分類	免疫生物製劑
藥品外觀	
副作用	
用藥指示	
藥品外觀	
用途	
適應症狀	
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IHBV
藥品名稱	B 肝疫苗
成分含量	Engerix-B 1ML
藥品分類	免疫生物製劑
藥品外觀	
副作用	注射部位紅痛腫脹,偶有發燒,疲倦
用藥指示	
藥品外觀	1ml/瓶裝 無色透明液
用途	
適應症狀	預防 B 型肝炎
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IHEPI
藥品名稱	HEPARIN 【&】 1000IU / 0.2ML 亞魯特
成分含量	HEPARIN 【&】 1000IU / 0.2ML 亞魯特
藥品分類	抗凝血劑
藥品外觀	
副作用	高警訊藥品。出血
用藥指示	
藥品外觀	5ml/瓶裝 無色透明液
用途	
適應症狀	血栓性栓塞症及其預防,抗凝血
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IHUM5
藥品名稱	紅色 Humalog Mix50[DM]
成分含量	100iu/ml
藥品分類	胰島素
藥品外觀	
副作用	
用藥指示	
藥品外觀	
用途	
適應症狀	
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IHUMN
藥品名稱	NPH(Humulin N 1000IU/10ML)[DM]
成分含量	NPH(Humulin N 1000IU/10ML)[DM]
藥品分類	胰島素
藥品外觀	
副作用	高警訊藥品。
用藥指示	
藥品外觀	
用途	
適應症狀	
用法用量	QD 每日一次 早上 飯後使用
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IHUMR
藥品名稱	RI
成分含量	(Humulin R 1000IU/10ML)[DM]優泌林常規型
藥品分類	胰島素
藥品外觀	
副作用	高警訊藥品。
用藥指示	
藥品外觀	
用途	
適應症狀	
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IHYA
藥品名稱	Hya-Joint Synovial Fluid
成分含量	2.5ml
藥品分類	
藥品外觀	
副作用	
用藥指示	
藥品外觀	
用途	
適應症狀	
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IHYDI
藥品名稱	HYDROXOCOBALAMIN
成分含量	1000MCG/ML
藥品分類	維生素 B 群
藥品外觀	
副作用	
用藥指示	
藥品外觀	
用途	
適應症狀	
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IIN
藥品名稱	INVANZ(ERTAPENEM)
成分含量	1GM 益滿治
藥品分類	其他 B-丙醯胺抗生素類
藥品外觀	
副作用	頭痛,血栓靜脈炎,腹瀉,噁心,嘔吐
用藥指示	
藥品外觀	白色粉末瓶裝
用途	
適應症狀	對抗多種革蘭氏陽性陰性需氧菌和厭氧菌
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IISO
藥品名稱	Isocin
成分含量	0.1% 10mg/10ml 艾舒心注射液
藥品分類	
藥品外觀	
副作用	高警訊藥品。
用藥指示	
藥品外觀	
用途	
適應症狀	
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IISOI
藥品名稱	ISOPTIN (Verapamil)
成分含量	5MG 衛汝心
藥品分類	心臟用藥
藥品外觀	
副作用	噁心,暈眩,精神紊亂,口齒不清
用藥指示	
藥品外觀	2ml/amp 無色透明液
用途	
適應症狀	狹心症
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IKAB
藥品名稱	Kabiven PI
成分含量	1440ML 克必恩
藥品分類	電解質.卡路里及水分平衡
藥品外觀	
副作用	
用藥指示	
藥品外觀	
用途	
適應症狀	
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IKCLI
藥品名稱	KCL(POTASSIUM CHLORIDE)
成分含量	15%氯化鉀 10ML/AMP
藥品分類	補充溶液複方
藥品外觀	
副作用	高警訊藥品。高血鉀症,噁心,嘔吐,腹痛,腹瀉
用藥指示	
藥品外觀	10ml /amp 黃色透明液
用途	
適應症狀	治療鉀缺乏症
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IKEI
藥品名稱	KETOPROFEN
成分含量	50MG/2ML 可多普洛菲
藥品分類	非類固醇類抗發炎劑
藥品外觀	
副作用	休克,噁心,嘔吐,胸悶
用藥指示	
藥品外觀	2ML/AMP 無色透明液
用途	
適應症狀	消炎,鎮痛,解熱
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IKENI
藥品名稱	Shincort
成分含量	5ml 信可得關節注射液
藥品分類	腎上腺素
藥品外觀	
副作用	浮腫,血壓上升
用藥指示	
藥品外觀	5ML/瓶裝 白色懸濁液
用途	
適應症狀	免疫治劑
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	ILASI
藥品名稱	LASIX(Furosemide)
成分含量	20mg/2ml 扶如泄民注射液
藥品分類	利尿劑
藥品外觀	
副作用	口乾,頻尿,肌肉痙攣
用藥指示	
藥品外觀	2ml/amp 無色透明液
用途	
適應症狀	泌尿,高血壓,水腫
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	ILEF
藥品名稱	LEFLODAL
成分含量	250MG/50ML
藥品分類	其他抗生素類
藥品外觀	
副作用	
用藥指示	
藥品外觀	
用途	
適應症狀	
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	


醫令代碼	ILEVI
藥品名稱	LEVOPHED(Norepinephrine)
成分含量	心復壓注射劑 4MG / 4ML
藥品分類	擬交感神經興奮藥物
藥品外觀	
副作用	頭痛,焦慮,呼吸困難
用藥指示	
藥品外觀	4ml/amp 無色透明液
用途	
適應症狀	急性低血壓,心跳停止
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	ILOSI
藥品名稱	Pantyl
成分含量	40MG 速潰樂凍晶注射劑
藥品分類	氫離子幫浦抑制劑
藥品外觀	
副作用	頭痛,腹瀉,噁心,嘔吐,腹痛,脹氣
用藥指示	
藥品外觀	白色凍晶瓶裝
用途	
適應症狀	胃,十二指腸,潰瘍,逆流性食道炎
用法用量	Q12H 每 12 小時使用一次
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IMANI
藥品名稱	Mannitol
成分含量	300ml 美必妥
藥品分類	利尿劑
藥品外觀	
副作用	血栓性靜脈炎
用藥指示	
藥品外觀	300ML/玻璃瓶無色液體
用途	
適應症狀	利尿、降顱內壓、腦水腫，促進毒物之尿中排除
用法用量	QD 每日一次 早上 飯後使用
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IMEI
藥品名稱	METHYCOBAL(Mecobalamin)
成分含量	500UG 彌可保
藥品分類	維生素 B 群
藥品外觀	
副作用	注射部位紅腫痛
用藥指示	
藥品外觀	1ml/amp 紅色透明液
用途	
適應症狀	維他命 B12 缺乏引起之貧血
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IMEP
藥品名稱	Meropenem powder
成分含量	500MG 麥羅乾粉注射劑
藥品分類	抗生素類
藥品外觀	
副作用	皮膚疹,腹瀉,噁心,嘔吐
用藥指示	
藥品外觀	
用途	
適應症狀	細菌性引起之感染症
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IMET
藥品名稱	METRONIDAZOLE
成分含量	500MG/100ML 沙普注射液
藥品分類	其他抗感染劑
藥品外觀	
副作用	噁心、嘔吐、皮膚過敏、口腔偶有金屬味覺
用藥指示	
藥品外觀	100ML/玻璃瓶無色液體
用途	
適應症狀	對 Metronidazole 具有感受性之厭氣菌所引起之感染症
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	INETI
藥品名稱	METHOXINE-M 免嗽克喘
成分含量	
藥品分類	CARESS SUPP
藥品外觀	
副作用	心悸,亢進,不眠,嘔吐
用藥指示	
藥品外觀	2ml/amp 無色透明液
用途	
適應症狀	支氣管氣喘,小兒氣喘,咳嗽
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IMGSO4
藥品名稱	MGSO4【&】 AMP
成分含量	
藥品分類	補充溶液
藥品外觀	
副作用	高警訊藥品。
用藥指示	
藥品外觀	
用途	
適應症狀	
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IMIA
藥品名稱	MIACALCIC AMPOULES
成分含量	100I.U./ML 密鈣息注射液
藥品分類	副甲狀腺
藥品外觀	
副作用	噁心,嘔吐,暈眩,潮紅
用藥指示	
藥品外觀	1ml/amp 無色透明液
用途	
適應症狀	高血鈣危象,停經後引起骨質疏鬆
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IMIX
藥品名稱	咖啡色 Humulin Mixture 70/30
成分含量	Humulin Mixture 70/30 1000ML/10ML[DM]優泌林-混合型
藥品分類	胰島素
藥品外觀	
副作用	高警訊藥品。低血糖
用藥指示	
藥品外觀	10ml/瓶裝 白色懸濁液
用途	
適應症狀	糖尿病
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IMIX1
藥品名稱	MIXTAL 1IU
成分含量	
藥品分類	胰島素
藥品外觀	
副作用	
用藥指示	
藥品外觀	
用途	
適應症狀	
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IMOI
藥品名稱	管 1-Morphine
成分含量	10mg/ml 鹽酸嗎啡注射劑
藥品分類	阿片類似藥
藥品外觀	
副作用	高警訊藥品。噁心,便秘,搔癢 ,休克,心跳停止
用藥指示	
藥品外觀	1ml/amp 無色透明液
用途	
適應症狀	解除末期癌症病人嚴重疼痛
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IN1
藥品名稱	0.9% N/S 1000ML 氯化鈉
成分含量	
藥品分類	補充溶液
藥品外觀	
副作用	血栓性靜脈炎
用藥指示	
藥品外觀	1000ML/軟袋無色液體
用途	
適應症狀	手術或其他疾病之水份及電解質之補充
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	INAL
藥品名稱	Narcan (Naloxone)鹽酸那囉克松
成分含量	
藥品分類	阿片拮抗劑
藥品外觀	
副作用	入睡困難,焦慮,神經質,腹痛,噁心,頭痛
用藥指示	
藥品外觀	1ml/amp 無色透明液
用途	
適應症狀	麻醉藥品過量之解毒劑
用法用量	QD 每日一次 早上 飯後使用
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	INEOSI
藥品名稱	VAGOSTIN(NEOSTIGMINE)
成分含量	1ML 安可健針
藥品分類	擬副交感神經興奮藥劑
藥品外觀	
副作用	比 Ambenonium 易產生嚴重的蕁毒素
用藥指示	
藥品外觀	1ML/安瓶無色液體
用途	
適應症狀	腸管麻痺、肌無力症、血管痙攣，眼筋無力症
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	INEX
藥品名稱	NEXIUM
成分含量	40MG 耐適恩注射劑
藥品分類	
藥品外觀	
副作用	
用藥指示	
藥品外觀	
用途	
適應症狀	
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	INOOI
藥品名稱	NOOTROPIL(Piracetam)
成分含量	1000MG/5ML 腦寶注射液
藥品分類	呼吸及大腦興奮劑
藥品外觀	
副作用	精神激昂,頭痛,噁心
用藥指示	
藥品外觀	5ml/amp 無色透明液
用途	
適應症狀	腦血管障礙及老化所引起之智力障礙
用法用量	BID 每日兩次 早晚 飯後使用
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	INOVI
藥品名稱	NOVAMIN(Prochlorperazine)
成分含量	5MG/ML 諾安命注射液
藥品分類	止吐劑
藥品外觀	
副作用	失眠,頭痛,暈眩
用藥指示	
藥品外觀	1ml/amp 無色透明液
用途	
適應症狀	精神病狀態,噁心,嘔吐
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	INOVO
藥品名稱	NovoMix30 flexpen
成分含量	100U/ml[DM]諾和密斯 30 諾易筆注射劑
藥品分類	胰島素
藥品外觀	
副作用	高警訊藥品。低血糖
用藥指示	依醫師指示使用
藥品外觀	懸浮注射液
用途	
適應症狀	糖尿病
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	INS
藥品名稱	0.9% N/S 500ML 氯化鈉
成分含量	
藥品分類	補充溶液
藥品外觀	
副作用	血栓性靜脈炎
用藥指示	
藥品外觀	500ML/硬瓶塑膠裝,無色透明液體
用途	
適應症狀	手術或其他疾病之水份及電解質之補充
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	INS3
藥品名稱	N S 3% 【&】 500ML
成分含量	3% 氯化鈉
藥品分類	補充容易
藥品外觀	
副作用	高警訊藥品。血栓性靜脈炎
用藥指示	
藥品外觀	500ML/玻璃瓶裝,無色透明液體
用途	
適應症狀	鈉或氯離子補充
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IOLD
藥品名稱	VAXIGRIP 老人感冒疫苗
成分含量	0.5ML/VIAL
藥品分類	VAXIGRIP
藥品外觀	 <p>The image shows two glass vials of VAXIGRIP vaccine, each with a syringe attached. The vials are positioned horizontally above a ruler. The ruler has markings from 0 to 10 centimeters. The vials are approximately 1.5 cm long. The labels on the vials are red and white, with 'VAXIGRIP' clearly visible. The background is a light blue surface.</p>
副作用	
用藥指示	
藥品外觀	
用途	
適應症狀	
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IOLDI
藥品名稱	自費流感疫苗 Fluvirin
成分含量	0.5ML/VIAL
藥品分類	VAXIGRIP
藥品外觀	
副作用	注射部會紅腫痛,偶有發燒
用藥指示	
藥品外觀	0.5ml 注射針 無色透明液
用途	
適應症狀	預防流行性感冒
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IOPN
藥品名稱	自費 OPNEUMOVAX/肺炎疫苗
成分含量	
藥品分類	
藥品外觀	
副作用	注射部位酸痛腫脹,偶有發燒
用藥指示	
藥品外觀	0.5ml/瓶裝 無色透明
用途	
適應症狀	預防肺炎鏈球菌性肺炎
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IPAMI
藥品名稱	PAM (Pralidoxime Chloride)
成分含量	500MG/10ml 百益
藥品分類	未分類治療藥物
藥品外觀	
副作用	眩暈,青紅幻視,複視,心跳加速,頭痛,噁心
用藥指示	
藥品外觀	10ml/amp 無色透明液
用途	
適應症狀	有機磷中毒解毒劑
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IPEN
藥品名稱	PENICILLIN
成分含量	100 萬 U 苄基青黴素鈉
藥品分類	抗生素－青黴素類
藥品外觀	
副作用	皮膚疹,頭痛,噁心
用藥指示	
藥品外觀	白色粉末瓶裝
用途	
適應症狀	細菌引起感染症
用法用量	Q6H 每 6 小時使用一次
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IPIC
藥品名稱	PICIBANIL 5KE (OK432)
成分含量	
藥品分類	PICIBANIL
藥品外觀	
副作用	
用藥指示	
藥品外觀	
用途	
適應症狀	
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IPIP
藥品名稱	Piperacillin powder for injection
成分含量	2GM 比拉幸乾粉注射劑
藥品分類	抗生素-青黴菌類
藥品外觀	 <p>The image shows two glass vials of Piperacillin Powder for Injection (2GM) standing next to a ruler. The vials have orange caps and green labels. The labels contain the following text: '比拉幸® 乾粉注射劑', 'Piperacillin Powder for Injection', '2GM', and '160701'. The ruler shows a scale from 0 to 12 cm.</p>
副作用	皮膚疹,腹瀉
用藥指示	
藥品外觀	白色粉末瓶裝
用途	
適應症狀	革蘭氏陽性及陰性厭氧菌及需氧菌引起之感染
用法用量	Q6H 每 6 小時使用一次
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IPITI
藥品名稱	PITRESSIN(Vasopressin)
成分含量	20UNITS 必壓生
藥品分類	腦垂體
藥品外觀	
副作用	噁心.嘔吐.眩暈.心律不整.皮膚疹
用藥指示	
藥品外觀	1ml/amp 無色透明液
用途	
適應症狀	食道靜脈曲張出血.尿崩症
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IPNE
藥品名稱	中央 75 歲以上肺炎疫苗 PNEUMOVAX
成分含量	
藥品分類	PNEUMOVAX
藥品外觀	
副作用	
用藥指示	
藥品外觀	
用途	
適應症狀	
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IPNE1
藥品名稱	桃園市 65-74 歲肺炎疫苗 PNEUMOVAX
成分含量	
藥品分類	PNEUMOVAX
藥品外觀	
副作用	
用藥指示	
藥品外觀	
用途	
適應症狀	
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IPRI
藥品名稱	PRIMPERAN(METOPERAN)
成分含量	10MG/2ML 胃得倍朗
藥品分類	其他腸胃道藥物
藥品外觀	
副作用	胃緊張.腹痛.便秘
用藥指示	
藥品外觀	2ml/amp 無色透明液
用途	
適應症狀	預防嘔吐.胃腸蠕動異常
用法用量	BID 每日兩次 早晚 飯後使用
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IROI
藥品名稱	PROGESTERONE
成分含量	25MG
藥品分類	黃體脂酮類
藥品外觀	
副作用	
用藥指示	
藥品外觀	
用途	
適應症狀	
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	


醫令代碼	IROL
藥品名稱	PROLIA 保絡麗注射液
成分含量	60mg
藥品分類	
藥品外觀	
副作用	
用藥指示	
藥品外觀	
用途	
適應症狀	
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IPROSI
藥品名稱	Prostaphlin(Oxacillin)
成分含量	1000mg 歐斯力娜乾粉注射劑
藥品分類	抗生素-青黴素類
藥品外觀	
副作用	噁心.嘔吐.腹瀉.胃炎
用藥指示	
藥品外觀	白色粉末瓶裝
用途	
適應症狀	葡萄球菌.鏈球菌.肺炎雙球菌.腦膜炎球菌
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IPRTI
藥品名稱	PROTAMINE
成分含量	50mg/5ml 硫酸魚精蛋白注射液
藥品分類	抗肝素劑
藥品外觀	
副作用	可能會引起血壓降低,心動徐緩 ,臉潮紅
用藥指示	
藥品外觀	5ml/瓶裝 無色透明液
用途	
適應症狀	中和過量的 Heparin
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IROI1
藥品名稱	SINTRIX 1GM (CEFTRIAZONE)信得瑞注射劑
成分含量	
藥品分類	抗生素-頭孢子菌類
藥品外觀	
副作用	
用藥指示	
藥品外觀	
用途	
適應症狀	
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IROL
藥品名稱	Rolikan injection
成分含量	250ML 樂麗康注射液
藥品分類	制酸劑及吸附劑
藥品外觀	
副作用	
用藥指示	
藥品外觀	
用途	
適應症狀	
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	ISAN
藥品名稱	SANDOSTATIN
成分含量	0.1MG/ML 善得定
藥品分類	腦垂體
藥品外觀	
副作用	食慾不振.噁心.嘔吐.腹脹.軟便.腹瀉
用藥指示	
藥品外觀	1ml/amp 透明液體
用途	
適應症狀	肢端肥大症.功能性胃腸胰內分泌性腫瘤
用法用量	Q8H 每 8 小時使用一次
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	ISOD
藥品名稱	SOD-BICARBONATE
成分含量	重曹注射液 7%
藥品分類	鹼化劑
藥品外觀	
副作用	高警訊藥品。血栓性靜脈炎
用藥指示	
藥品外觀	20ML/玻璃安瓶無色液體
用途	
適應症狀	制酸劑，及一般酸中毒性疾患
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	ISOI
藥品名稱	Methylprednisolone40mg(SOLU-MEDROL)
成分含量	
藥品分類	未分類治療藥物
藥品外觀	
副作用	水腫,體液和電解質失調
用藥指示	
藥品外觀	白色粉末瓶裝
用途	
適應症狀	免疫治劑
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	ISOLI
藥品名稱	SOLU-TISONE
成分含量	100MG 舒爾體爽注射劑
藥品分類	腎上腺素
藥品外觀	
副作用	水腫,體液和電解質失調
用藥指示	
藥品外觀	白色粉末瓶裝
用途	
適應症狀	免疫治劑
用法用量	QD 每日一次 早上 飯後使用
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IST
藥品名稱	STRONGER NEO-MINOPHAGEN C
成分含量	
藥品分類	腎上腺素
藥品外觀	
副作用	
用藥指示	
藥品外觀	
用途	
適應症狀	
用法用量	QD 每日一次 早上 飯後使用
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	ISTI
藥品名稱	STIN (Acetylsalicylic acid)
成分含量	0.5GM 賜鎮注射液
藥品分類	非類固醇類抗發炎劑
藥品外觀	
副作用	
用藥指示	
藥品外觀	
用途	
適應症狀	
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	ISTII
藥品名稱	STIN(Acetylsalicylic acid)
成分含量	0.5GM 解你疼乾粉注射劑
藥品分類	非類固醇類抗發炎劑
藥品外觀	
副作用	皮膚疹,腸胃不適
用藥指示	
藥品外觀	白色粉末瓶裝
用途	
適應症狀	解熱,鎮痛
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	


醫令代碼	ISTRI
藥品名稱	STREPTOMYCIN
成分含量	1GM 鏈黴素
藥品分類	抗生素-胺基配醣體
藥品外觀	
副作用	迷走神經受損,聽力受損,肝腎毒性
用藥指示	
藥品外觀	白色粉末瓶裝
用途	
適應症狀	結核菌感染症
用法用量	Q6H 每 6 小時使用一次
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	ISUL
藥品名稱	Sulbactam Powder 500mg
成分含量	
藥品分類	其他抗生素類
藥品外觀	
副作用	皮膚疹,腸胃不適,頭痛
用藥指示	
藥品外觀	白色粉末瓶裝
用途	
適應症狀	Beta-lactamase 抑制劑
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	ITAGI
藥品名稱	Tagamet(Suwelin)
成分含量	200mg 壽胃寧
藥品分類	H2-拮抗劑
藥品外觀	 A photograph of a 2ml ampoule of Tagamet (Suvonin) with a ruler for scale. The ampoule is clear glass with a blue label that reads '200mg', 'SUVONIN', 'cimetidine', '2 ml', 'S.E. OGDEN', 'T. J. OGDEN', 'MANUFACTURER'. The ampoule is placed on a ruler showing centimeters and millimeters.
副作用	下痢,疲倦,暈眩,發疹
用藥指示	
藥品外觀	2ml/amp 無色透明液
用途	
適應症狀	治療胃,十二指腸潰瘍
用法用量	Q8H 每 8 小時使用一次
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	ITAZ
藥品名稱	Tazocin (PISUTAM)
成分含量	2.25gm 帝斯坦乾粉注射劑
藥品分類	抗生素-青黴菌類
藥品外觀	
副作用	皮膚疹,搔癢,腹瀉
用藥指示	
藥品外觀	白色粉末瓶裝
用途	
適應症狀	對 Beta-lactamase 產生菌株所引起感染
用法用量	Q12H 每 12 小時使用一次
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	ITIG
藥品名稱	Tigelin lyophilized powder
成分含量	50MG 虎霸凍晶注射劑
藥品分類	
藥品外觀	
副作用	
用藥指示	
藥品外觀	
用途	
適應症狀	
用法用量	Q12H 每 12 小時使用一次
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	ITII
藥品名稱	Tienam 500mg
成分含量	
藥品分類	其他 B-丙醯胺抗生素類
藥品外觀	
副作用	皮膚疹,腹瀉
用藥指示	
藥品外觀	白色粉末瓶裝
用途	
適應症狀	革蘭氏陰性陽性菌引起之感染
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	ITRCI
藥品名稱	TRACRIUM (Atracurium)
成分含量	25MG/2.5ml 妥開利
藥品分類	骨骼肌鬆弛劑
藥品外觀	
副作用	低血壓,皮膚發紅
用藥指示	
藥品外觀	2.5ml/amp 無色透明液
用途	
適應症狀	作為手術全身麻醉或鎮靜時的輔助劑
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	ITRI
藥品名稱	Tren 5CC(Tranexamic)特朗注射液
成分含量	
藥品分類	止血劑
藥品外觀	
副作用	噁心,胸悶,心悸,血壓下降
用藥指示	
藥品外觀	5ml/amp 無色透明液
用途	
適應症狀	全身局部出血或出血性疾病
用法用量	BID 每次兩次 早晚 飯後使用
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	ITRNI
藥品名稱	TRANDATE(Ladetalol)
成分含量	25mg/5ML 湍泰低
藥品分類	降血壓藥
藥品外觀	
副作用	高警訊藥品。姿勢性低血壓
用藥指示	
藥品外觀	5ml/amp 無色透明液
用途	
適應症狀	高血壓
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	ITTO1
藥品名稱	Tetanus toxoid alum precipitated 1ml 明礬
成分含量	
藥品分類	類毒素類
藥品外觀	
副作用	注射部位紅腫痛,偶有發燒頭痛
用藥指示	
藥品外觀	20ml 瓶裝 渾濁白色液
用途	
適應症狀	20ml 瓶裝 渾濁白色液
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IUNA1
藥品名稱	Amsulber powder for injection (Ampicillin/sulbactam)
成分含量	1.5Gm 安疏倍乾粉注射劑
藥品分類	其他抗生素類複方
藥品外觀	
副作用	皮膚疹,腹瀉
用藥指示	
藥品外觀	白色粉末瓶裝
用途	
適應症狀	細菌性引起之感染症
用法用量	Q6H 每 6 小時使用一次
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IURO
藥品名稱	Urokinase 6000iu
成分含量	
藥品分類	血栓溶解劑
藥品外觀	
副作用	
用藥指示	
藥品外觀	
用途	
適應症狀	
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IVALI
藥品名稱	管 4-VALIUM 【&】 (Diazepam)
成分含量	10MG/2ML 樂平注射液
藥品分類	苯二氮平衍生物
藥品外觀	
副作用	高警訊藥品。精神紊亂,皮膚疹搔癢,暈眩
用藥指示	
藥品外觀	2 ml/amp 無色透明液
用途	
適應症狀	焦慮,肌肉痙攣,失眠
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	


醫令代碼	IVANC
藥品名稱	VANCOMYCIN HCL
成分含量	500MG 穩利乾粉注射劑(汎克黴素)
藥品分類	抗生素類
藥品外觀	
副作用	皮膚疹搔癢,潮紅
用藥指示	
藥品外觀	白色凍晶瓶裝
用途	
適應症狀	葡萄球菌引起之感染症
用法用量	Q8H 每 8 小時使用一次
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IVAR
藥品名稱	VARILIX 水痘疫苗
成分含量	
藥品分類	血清.類毒素及疫苗類
藥品外觀	
副作用	
用藥指示	
藥品外觀	
用途	
適應症狀	
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IVEN
藥品名稱	Diphenhydramine HCL30MG/ml 鹽酸二苯胺明注射液 3 %
成分含量	
藥品分類	抗組織胺劑
藥品外觀	
副作用	暈眩,睡意,食慾不振
用藥指示	
藥品外觀	1ml/amp 無色透明液
用途	
適應症狀	過敏性疾病
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IVFE
藥品名稱	VFEND 200MG 徽飛凍晶注射液
成分含量	
藥品分類	
藥品外觀	
副作用	
用藥指示	
藥品外觀	
用途	
適應症狀	
用法用量	Q12H 每 12 小時使用一次
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IVITKI
藥品名稱	VIT K1 10MG/ML 維他命 K1 注射液
成分含量	
藥品分類	維生素 K 活性
藥品外觀	
副作用	注射部位紅腫痛
用藥指示	
藥品外觀	1ML/AMP 無色透明液
用途	
適應症狀	止血劑
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IXYLI2
藥品名稱	XYLOCAINE
成分含量	2%(Lidocaine)5ML 靜注用苦息樂卡因
藥品分類	心臟用藥
藥品外觀	 <p>The image shows two ampoules of Xylocaine 2% for intravenous injection. The packaging is white with blue and yellow accents. The text on the packaging includes: '3ml L contains 100mg of Lidocaine hydrochloride', 'Do not store above 30 °C', 'AstraZeneca', 'EXP. DATE', 'LOT', 'Xylocaine® 2% for Intravenous Injection', 'Lidocaine 2%'. A ruler is placed below the ampoules for scale, showing they are approximately 5 cm long.</p>
副作用	暈眩,嗜睡,不安
用藥指示	
藥品外觀	5ml/amp 無色透明液
用途	
適應症狀	心室性不整律之急性治療
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IZAN
藥品名稱	VESYCA(Ranitidine)
成分含量	25mg/ml 2ml 胃治潰注射液
藥品分類	H2-拮抗劑
藥品外觀	
副作用	皮膚疹,搔癢
用藥指示	
藥品外觀	2ml/amp 無色透明液
用途	
適應症狀	胃,十二指腸潰瘍
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	

醫令代碼	IZYV
藥品名稱	ZYVOX 2MG/ML 300ML 采福適注射劑
成分含量	
藥品分類	其他抗生素類
藥品外觀	
副作用	
用藥指示	
藥品外觀	
用途	
適應症狀	
用法用量	
懷孕哺乳	
禁忌	
注意事項	